



РИПРЕТИНІБ - КІНЛОК®

Що таке КІНЛОК

Назва препарату	Опис
Рипретиніб	Пігулка 50 мг

Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

У Вашому випадку дозування таке: мг/день, тобто пігулок мг, приймати за один прийом, щодня.

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не подрібнюючи, не розрізаючи та не розчиняючи пігулки.

Приймати в один і той самий час, з їжею чи без їжі.

Якщо Ви забули прийняти дозу, її можна прийняти протягом 8 годин. Однак у разі блювання не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

Дозування – схема приймання

Один раз на день, в один і той самий час, з їжею чи без їжі	  
Без перерви	 J1  J2  J3  J4  J5  J6  J7 ...  J28

Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в місцевих аптеках.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь.

Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

Що ще треба знати?

Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників складу крові), а також моніторинг клінічного стану (дерматологічне обстеження, вимірювання артеріального тиску, кардіологічне обстеження).

Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування та один місяць після його завершення Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між КІНЛОКОМ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

Приклад: При прийманні КІНЛОКА® слід уникати вживання звіробою та грейпфрутового соку.

Які є можливі побічні явища?

Нижче перелічені найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.

Побічні явища



Найбільш поширені	Порушення травлення: нудота, блювання, біль в животі, діарея, закріп, запалення у роті (виразки), втрата апетиту Проблеми зі шкірою: запалення долонь, підошов стоп і ділянок тертя (синдром «рука-нога»), сухість, свербіж, випадіння волосся, уповільнене загоєння ран Інше: гіпертонія, біль у м'язах и суглобах, стомленість
Про що слід повідомляти медичному персоналу?	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	Порушення травлення Суттєва та (або) швидка втрата ваги Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу Випорожнення рідше 3 разів на тиждень Сильний біль у животі Біль у роті або виразки, що перешкоджають нормальному прийому їжі Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин Симптоми, що свідчать про гіпертонію Головний біль, шум у вухах та (або) запаморочення Збільшення показників артеріального тиску Симптоми, що свідчать про порушення роботи серця Задихка, прискорене серцебиття, біль або почуття стиснення в грудях
Як запобігти побічним явищам?	
Контроль за тиском	Необхідно відкоригувати підвищений тиск. Рекомендується регулярно вимірювати артеріальний тиск . Фармацевти можуть допомогти Вам виміряти тиск. Ви також можете попросити зробити це самостійно за допомогою автоматичного тонометра.
Догляд за шкірою	<i>На кистях рук і стопах:</i> Наносіть на кисті рук і стопи зволожуючий крем або лосьйон, і (або) загоючий крем (не втираючи сильно). Уникайте піддавати кисті рук і ступні дії високих температур (гарячої води). Уникайте видів діяльності, які спричиняють натирання або пошкодження шкіри. Уникайте носити занадто тісний одяг, шкарпетки та взуття. <i>Тіло:</i> Використовуйте для умивання м'яке мило та зволожувальний засіб, підсушуйте шкіру промоканням. Уникайте використання будь-яких продуктів, що дратують шкіру. <i>Для захисту від сонця</i> використовуйте крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та уникайте впливу сонячних променів.
Гігієна порожнини рота	Використовуйте м'яку зубну щітку, використовуйте ополаскувачі для рота, що містять питну соду. Уникайте ополаскувачів для рота, що містять ментол або спирт.
Втомлюваність	Робіть вибір на користь занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підібраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт... Чергуйте періоди активності та відпочинку.
Вага	При розладах травлення регулярно перевіряйте свою вагу .
Як адаптувати свою дієту?	
Діарея	Робіть вибір на користь дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще вживати продукти, що містять крохмаль, моркву, банани. Уникайте вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. Пийте більше води.
Закріп	Робіть вибір на користь дієти з високим вмістом клітковини. Пийте більше води.
Нудота	Робіть вибір на користь дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. Обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі.



Втрата апетиту	Робіть вибір на користь більш калорійної дієти та «дієти задоволення».
Запалення у роті (виразки)	Уникайте вживання кислої, клейкої та дуже солоної їжі.

