



ТУКАТИНІБ - ТУКІСА®

Що таке ТУКІСА

Назва препарату	Опис
Тукатиніб	Пігулки 150 мг та 50 мг 

Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

У Вашому випадку дозування таке: мг/день, тобто... пігулок мг, 2 рази на день, щодня. Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не подрібнюючи, не розрізаючи та не розжовуючи пігулки.

Приймати в один і той самий час, з їжею чи без їжі.

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

Дозування – схема приймання

Приймати 2 рази на день, в один і той самий час, з їжею чи без їжі	  
Усі дні без перерви	

Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в місцевих аптеках.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь.

Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

Що ще треба знати?

Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників складу крові, а також функції нирок та печінки).

Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування та один місяць після його завершення Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між ТУКІСОЮ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

Приклад: При прийманні ТУКІСИ® слід уникати вживання звіробую та грейпфрута.



Програма ONCOLIEN Товариства онкологічної фармації Франції надається у розпорядження відповідно до умов міжнародної ліцензії 4.0 «Із зазначенням авторства — із збереженням умов». Базується на роботі <https://oncolien.sfpo.com>. Дозволи, що виходять за рамки цієї ліцензії, можна отримати на сайті <https://www.sfpo.com>.

Товариство онкологічної фармації Франції – Інформаційний листок для пацієнтів, які отримують хіміотерапію

Які є можливі побічні явища?

Нижче перелічені найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.

Побічні явища	
Найбільш поширені	Порушення травлення: діарея, нудота, блювання, потеря веса, запалення у роті (виразки) Проблеми зі шкірою: висипи Інше: кровотечі, біль у суглобах Відхилення в результатах лабораторних досліджень: порушення функції печінки та нирок
Про що слід повідомляти медичному персоналу?	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	Порушення травлення: Суттєва та (або) швидка втрата ваги Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу Біль у роті або виразки, що перешкоджають нормальному прийому їжі Сильний біль у животі Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин Симптоми, що свідчать про крововилив: Кров у випорожненні чи у блювотних масах Гематоми (синці), носові кровотечі
Як запобігти побічним явищам?	
Догляд за шкірою	<u>На кистях рук і стопах:</u> Наносіть на кисті рук і стопи зволожуючий крем або лосьйон, і (або) загоючий крем (не втираючи сильно). Уникайте піддавати кисті рук і ступні дії високих температур (гарячої води). Уникайте видів діяльності, які спричиняють натирання або пошкодження шкіри. Уникайте носити занадто тісний одяг, шкарпетки та взуття. <u>Тіло:</u> Використовуйте для умивання м'яке мило та зволожувальний засіб, підсушуйте шкіру промоканням. Уникайте використання будь-яких продуктів, що дратують шкіру. <u>Для захисту від сонця</u> використовуйте крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та уникайте впливу сонячних променів.
Вага	При розладах травлення регулярно перевіряйте свою вагу .
Гігієна порожнини рота	Використовуйте м'яку зубну щітку, використовуйте ополаскувачі для рота, що містять питну соду. Уникайте ополіскувачів для рота, що містять ментол або спирт.
Біль у суглобах	Займайтеся підібраними видами фізичного навантаження.
Як адаптувати свою дієту?	
Діарея	Робіть вибір на користь дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще вживати продукти, що містять крохмаль, моркву, банани. Уникайте вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. Пийте більше води.
Нудота	Робіть вибір на користь дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. Обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі.
Запалення у роті (виразки)	Уникайте вживання кислої, клейкої та дуже солоної їжі.

