



Что такое ЗИКАДИЯ®

Название препарата	Описание
Церитиниб	Желатиновая капсула 150 мг, голубая с белым 

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова:..... мг/день, т.е. желатиновых капсул 150 мг в день, один раз в день, каждый день. Глотать целиком, запивая стаканом воды, не открывая и не растворяя капсулы.

Принимать в установленное время, во время еды.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

Один раз в день, в установленное время, с едой									
Без перерыва									
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7	...	Д28

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеке по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее. Храните это средство в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга функции печени, уровня калия и глюкозы), а также мониторинг клинического состояния (артериальное давление, электрокардиограмма).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между ЗИКАДИЕЙ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т.д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме ЗИКАДИИ® следует избегать употребления грейпфрута, зверобоя, больдо, фукуса, пассифлоры.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ



Самые распространённые	<p>Нарушения пищеварения: диарея, тошнота, рвота, боли в животе, потеря веса и аппетита, запор, кислотный рефлюкс</p> <p>Отклонения в результатах анализа крови: повышение ферментов печени, снижение креатинина (функция почек) и гемоглобина (анемия)</p> <p>Прочие: сыпь, усталость</p> <p>Проблемы со зрением: нечёткость зрения, чувствительность к свету</p>
Некоторые пациенты требуют особого внимания	Риск гипергликемии, усиленное наблюдение за <i>больными сахарным диабетом</i>
О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<p>Нарушения пищеварения</p> <ul style="list-style-type: none"> > Существенная и (или) быстрая потеря веса > Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки > Сильная боль в животе > Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов > Стул реже 3 раз в неделю <p>Симптомы, свидетельствующие о респираторных заболеваниях</p> <p>Постоянный усиливающийся кашель или затруднённое дыхание</p> <p>Симптомы гипергликемии</p> <ul style="list-style-type: none"> > Значительные и частые позывы пить, есть и мочиться, в сочетании с усталостью <p>Симптомы, свидетельствующие о нарушении работы сердца</p> <ul style="list-style-type: none"> > Одышка, недостаток энергии, головокружение > Отечность ног > Голубые губы или кожа
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?	
Вес	При расстройствах пищеварения или отёках ног регулярно проверяйте свой вес.
Глаза	Избегайте носить контактные линзы. Избегайте водить машину при слабой освещённости.
Запор	<i>Для стимулирования кишечного транзита</i> занимайтесь подобранной и регулярной физической нагрузкой: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт...
Уход за кожей	Делайте выбор в пользу мягкого мыла и увлажняющего средства, осушайте кожу промоканием. Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу. <i>Для защиты от солнца используйте</i> крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра и избегайте воздействия солнечных лучей
Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.
КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?	
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте побольше воды.
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Потеря веса	Делайте выбор в пользу более калорийной диеты и «диеты удовольствия».
Запор	Делайте выбор в пользу диеты с высоким содержанием клетчатки. Пейте побольше воды.
Проблемы с печенью и поджелудочной железой	Избегайте употребления алкоголя.

