



Что такое КСАЛКОРИ®

Название препарата	Описание
Кризотиниб	<p>Желатиновая капсула 200 мг, белая с розовым Желатиновая капсула 250 мг, розовая</p> 

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: мг/день, т.е. 1 желатиновая капсула мг 2 раза в день, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не открывая и не растворяя капсулы. В установленное время, с едой или без еды.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

2 раза в день, в установленное время, с едой или без еды									
Без перерыва								...	
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7		Д28

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеках по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните это средство в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей состава крови, функции печени и почек, уровня калия, кальция и магния), а также мониторинг клинического состояния (артериальное давление, частота сердечных сокращений, электрокардиограмма).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребёнку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между КСАЛКОРИ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме КСАЛКОРИ® следует избегать употребления грейпфрутового сока, зверобоя, больдо, фукуса, азиатского женьшеня, померанца, пассифлоры, одуванчика.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ



Самые распространённые	<p>Проблемы со зрением</p> <p>Нарушения пищеварения: тошнота, диарея, рвота, запор, потеря аппетита, боли в животе, нарушение вкусового восприятия</p> <p>Общие: усталость, головокружения, пониженная частота сердечных сокращений, отёки (лицо, ноги, руки)</p> <p>Отклонения в результатах лабораторных исследований: низкий уровень гемоглобина (анемия) и (или) белых кровяных телец (нейтропения), отклонение от нормы печёночных проб</p> <p>Прочие: нейропатия (ощущение мурашек по телу, нарушения чувствительности), кожные высыпания</p>
О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<ul style="list-style-type: none"> > Нарушения пищеварения > Существенная и (или) быстрая потеря веса > Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки > Сильная боль в животе > Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов > Стул реже 3 раз в неделю Симптомы, свидетельствующие об инфекции > Температура > 38,5 °C > Кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании, диарея с повышенной температурой Симптомы, свидетельствующие о нарушении работы сердца Потеря сознания, учащённое сердцебиение > Одышка, недостаток энергии, головокружения Проблемы с глазами > Снижение зрения Респираторные заболевания > Постоянный усиливающийся кашель или затруднённое дыхание
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?	
Вес	При расстройствах пищеварения или отёках регулярно проверяйте свой вес.
Запор	Для стимулирования кишечного транзита занимайтесь подобранной и регулярной физической нагрузкой: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт...
Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.
Инфекция	Избегайте посещать места повышенного риска (скопление людей, контакт с больными людьми, ...). Вам может быть рекомендована прививка от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит.
Уход за кожей	Делайте выбор в пользу мягкого мыла и увлажняющего средства, осушайте кожу промоканием. Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу. Для защиты от солнца используйте крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра и избегайте воздействия солнечных лучей
Отёки	Избегайте слишком тесной одежды, носков и обуви. Кладите ноги в возвышенное положение.
КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?	
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте побольше воды.
Запор	Делайте выбор в пользу диеты с высоким содержанием клетчатки. Пейте побольше воды.
Нарушения вкусового восприятия	Делайте выбор в пользу нескольких небольших приёмов тёплой и холодной пищи в день. Избегайте употребления металлических кухонных принадлежностей.
Потеря веса	Делайте выбор в пользу более калорийной диеты и «диеты удовольствия».

