




Що таке ЕНДОКСАН®

| Назва препарату | Опис |
|-----------------|---|
| Циклофосфамід | Пігулка 50 мг: біла, кругла  |

Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

















У Вашому випадку дозування таке:..... мг/день, тобто пігулок 50 мг на день, приймати вранці, (вказіть, приймати безперервно чи ні).

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не подрібнюючи, не розрізаючи, не розжовуючи та не розчиняючи пігулки.

У встановлений час, з проміжком часу між прийманням ліків та прийманням їжі.

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

Дозування – схема приймання

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|---|---|--|
| Один раз на день, у встановлений час, уранці натще |  Натще |   |   |   | | | | | |
| Без перерви Існують інші схеми приймання. Наприклад: з Д1 по Д14, відновити в Д28 |  Д1 |  Д2 |  Д3 |  Д4 |  Д5 |  Д6 |  Д7 |  |  Д28 |

Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в аптеках за місцем проживання.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь. Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

Що ще треба знати?

Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників формули крові, функції печінки та нирок), а також моніторинг клінічного стану (електрокардіограма).

Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між ЕНДОКСАНОМ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

Приклад: При прийманні ЕНДОКСАНУ® слід уникати вживання звіробю та грейпфрутового соку.

Які є можливі побічні явища?

Нижче перелічені лише найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.

ПОБІЧНІ ЯВИЩА



Програма ONCOLIEN Товариства онкологічної фармації Франції надається у розпорядження відповідно до умов міжнародної ліцензії 4.0 «Із зазначенням авторства — із збереженням умов». Баується на роботі <https://oncolien.sfpo.com>. Дозволи, що виходять за рамки цієї ліцензії, можна отримати на сайті <https://www.sfpo.com>.

| | |
|---|--|
| Найбільш поширені | <p>Порушення травлення: нудота, блювота, діарея, запалення в роті (виразки)</p> <p>Відхилення у результатах аналізу крові: зниження кількості білих кров'яних тілець (нейтропенія) та відхилення від норми функціональних проб печінки</p> <p>Безпліддя у чоловіків та у жінок</p> <p>Інші: підвищена температура, інфекція сечовивідних шляхів, кров у сечі (внаслідок подразнення сечового міхура), випадання волосся (алопеція)</p> |
| ПРО ЩО СЛІД ПОВІДОМЛЯТИ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ? | |
| Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій | <p>Порушення травлення</p> <ul style="list-style-type: none"> > Суттєва та (або) швидка втрата ваги > Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу > Біль у роті або виразки, що перешкоджають нормальному прийому їжі > Сильний біль у животі > Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин <p>Симптоми, що свідчать про порушення роботи нирок</p> <ul style="list-style-type: none"> > Кров у сечі > Утруднене сечовипускання або відсутність сечі <p>Симптоми, що свідчать про інфекцію</p> <ul style="list-style-type: none"> > Температура > 38,5 °C Кашель, біль у горлі, біль при сечовипусканні, діарея з підвищеною температурою <p>Респіраторні захворювання</p> <ul style="list-style-type: none"> > Постійний посилюючий кашель чи утруднене дихання <p>Симптоми, що свідчать про порушення роботи серця</p> <ul style="list-style-type: none"> > Втрата свідомості, прискорене серцебиття |
| ЯК ЗАПОБІГТИ ПОБІЧНИМ ЯВИЩАМ? | |
| Гігієна порожнини рота | Використовуйте м'яку зубну щітку, використовуйте ополаскувачі для рота, що містять питну соду. Уникайте ополіскувачів для рота, що містять ментол або спирт. |
| Інфекція | Уникайте відвідувати місця підвищеного ризику (скупчення людей, контакт із хворими людьми, ...). Вам може бути рекомендовано щеплення від грипу та від пневмококової інфекції: воно вас захистить |
| Вага | При розладах травлення регулярно перевіряйте свою вагу . |
| Безпліддя | Перед початком лікування дізнайтеся у свого лікаря про способи збереження сперми та гамет. |
| Випадання волосся | Підстрижіть волосся. Дізнайтеся щодо перук і про те, як відшкодується їх вартість. |
| ЯК АДАПТУВАТИ СВОЮ ДІЄТУ? | |
| Нудота | Робіть вибір на користь дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. Обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі. |
| Діарея | Робіть вибір на користь дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще вживати продукти, що містять крохмаль моркву, банани. Уникайте вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. Пийте більше води. |
| Запалення у роті (виразки) | Уникайте вживання кислої, клейкої та дуже солоної їжі. |

