



Что такое ЭНДОКСАН®

Название препарата	Описание
Циклофосфамид	<p>Таблетка 50 мг: белая, круглая</p> 

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова:..... мг/день, т.е. таблеток 50 мг в день, принимать утром,

(укажите, принимать непрерывно или нет)

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая, не разрезая, не разжёвывая и не растворяя таблетки.

В установленное время, с промежутком времени между приёмом лекарства и приёмом пищи.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

<p>1 Один раз в день, в установленное время, утром натощак</p>									
<p>Без перерыва существуют другие схемы приёма. Например: с Д1 по Д14, возобновить в Д28</p>	 <p>Д1</p>	 <p>Д2</p>	 <p>Д3</p>	 <p>Д4</p>	 <p>Д5</p>	 <p>Д6</p>	 <p>Д7</p>	<p>...</p>	 <p>Д28</p>

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеке по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее. Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей формулы крови, функции печени и почек), а также мониторинг клинического состояния (электрокардиограмма).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между ЭНДОКСАНОМ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме ЭНДОКСАНА® следует избегать употребления зверобоя и грейпфрутового сока.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ



Программа ONCOLIEN Общества онкологической фармации Франции предоставляется в распоряжение в соответствии с условиями международной лицензии 4.0 «С указанием авторства — с сохранением условий». Основано на работе <https://oncolien.sfpo.com>. Разрешения, выходящие за рамки данной лицензии, можно получить на сайте <https://www.sfpo.com>

Самые распространённые	<p>Нарушения пищеварения: тошнота, рвота, диарея, воспаление во рту (язвы)</p> <p>Отклонения от нормы в результатах анализа крови: низкое содержание белых кровяных телец (нейтропения) и отклонение от нормы печёночных проб</p> <p>Бесплодие у мужчин и у женщин</p> <p>Прочие: повышенная температура, инфекция мочевых путей, кровь в моче (вследствие раздражения мочевого пузыря), выпадение волос (алопеция)</p>
О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<p>Нарушения пищеварения</p> <ul style="list-style-type: none"> > Существенная и (или) быстрая потеря веса > Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки > Боль во рту или язвы, препятствующие нормальному приёму пищи > Сильная боль в животе > Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов <p>Симптомы, свидетельствующие о нарушении работы почек</p> <ul style="list-style-type: none"> > Кровь в моче > Затрудненное мочеиспускание или отсутствие мочи <p>Симптомы, свидетельствующие об инфекции</p> <ul style="list-style-type: none"> > Температура > 38,5 °C > Кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании, диарея с повышенной температурой <p>Респираторные заболевания</p> <p>Постоянный усиливающийся кашель или затруднённое дыхание</p> <p>Симптомы, свидетельствующие о нарушении работы сердца</p> <p>Потеря сознания, учащённое сердцебиение</p>
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?	
Гигиена полости рта	Используйте мягкую зубную щетку, используйте ополаскиватели для рта, содержащие питьевую соду. Избегайте ополаскивателей для рта, содержащих ментол или спирт.
Инфекция	Избегайте посещать места повышенного риска (скопление людей, контакт с больными людьми,...). Вам может быть рекомендована прививка от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит.
Вес	При расстройствах пищеварения регулярно проверяйте свой вес.
Бесплодие	Перед началом лечения узнайте у своего врача о способах сохранения спермы и гамет.
Выпадение волос	Подстригите волосы. Узнайте относительно париков и того, как возмещается их стоимость
КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?	
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте побольше воды.
Воспаления во рту (язвы)	Избегайте употребления кислой, клейкой и очень солёной пищи.

