



Что такое СПРАЙСЕЛ®

| Название препарата | Описание |
|--------------------|--|
| Дасатиниб | Таблетка 20 мг: белая, круглая Таблетка 50 мг: белая, овальная Таблетка 70 мг: белая, круглая Таблетка 100 мг: белая, овальная Таблетка 140 мг: белая, круглая Существуют непатентованные препараты различной формы |

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: мг/день, т.е. таблеток 20 мг или таблеток 50 мг, илитаблеток 70 мг, или таблеток 100 мг, илитаблеток 140 мг, один раз в день, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая, не разрезая, не разжёвывая и не растворяя таблетки.

В установленное время, с едой или без еды.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

| | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Один раз в день, в установленное время, с едой или без еды | | | | | | | | | |
| Без перерыва | | | | | | | | | |
| | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 | Д7 | ... | Д28 |

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеке по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните это средство в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей формулы крови, уровня электролитов, функции печени и почек), а также мониторинг клинического состояния (артериальное давление).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между СПРАЙСЕЛОМ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме СПРАЙСЕЛА® следует избегать употребления зверобоя и грейпфрута.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления.

Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ



| | |
|------------------------|---|
| Самые распространённые | <p>Нарушения пищеварения: тошнота, рвота, диарея, боли в желудке</p> <p>Нарушения количественных показателей состава крови: низкое содержание тромбоцитов (тромбоцитопения) и (или) многоядерных нейтрофилов (нейтропения), низкий уровень гемоглобина (анемия)</p> <p>Общие расстройства: отёки конечностей и (или) лица, удержание воды</p> <p>Боли: судороги, боль в мышцах, головные боли</p> <p>Проблемы с кожей: кожная сыпь, зуд, изменение текстуры или цвета волос (возможно выпадение волос)</p> <p>Нарушения работы сердца: сильное, быстрое или нерегулярное сердцебиение</p> <p>Респираторные заболевания</p> <p>Кровотечения, усталость</p> |
|------------------------|---|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Некоторые пациенты требуют особого внимания | Пациенты – носители вируса гепатита Б |
|---|---------------------------------------|

О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?

| | |
|--|--|
| Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций | <p>Нарушения пищеварения</p> <ul style="list-style-type: none"> > Существенная и (или) быстрая потеря веса > Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки > Сильная боль в животе > Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов <p>Симптомы, свидетельствующие об инфекции</p> <ul style="list-style-type: none"> > Температура > 38,5 °C > Кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании, диарея с повышенной температурой <p>Симптомы, свидетельствующие о кровоизлиянии</p> <ul style="list-style-type: none"> > Кровь в стуле или в рвотных массах Гематомы (синяки), носовые кровотечения <p>Респираторные заболевания</p> <ul style="list-style-type: none"> Постоянный усиливающийся кашель или затруднённое дыхание <p>Боль, мешающая Вам заниматься своей обычной деятельностью</p> <ul style="list-style-type: none"> > Головные боли и (или) боли в суставах <p>Симптомы, свидетельствующие об удержании воды</p> <ul style="list-style-type: none"> Быстрое и неожиданное увеличение веса <p>Симптомы, указывающие на заболевание сердца или сосудов</p> <ul style="list-style-type: none"> > Головные боли, шум в ушах и (или) головокружение > Увеличение показателей артериального давления Одышка, учащённое сердцебиение, боль или стеснение в груди |
|--|--|

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?

| | |
|-----------------------|---|
| Уход за кожей | Делайте выбор в пользу мягкого мыла и увлажняющего средства, осушайте кожу промоканием. Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу. Для защиты от солнца используйте крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра и избегайте воздействия солнечных лучей. |
| Вес | При расстройствах пищеварения или удержании воды регулярно проверяйте свой вес. |
| Удержание воды | Избегайте слишком тесной одежды, носков и обуви. Кладите ноги в возвышенное положение. |
| Инфекция | Избегайте посещать места повышенного риска (скопление людей, контакт с большими людьми,...). Вам может быть рекомендована прививка от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит. |
| Контроль за давлением | Необходимо откорректировать повышенное давление. Рекомендуется регулярно измерять артериальное давление. Фармацевты могут помочь Вам измерить давление. Вы также можете попросить сделать это самостоятельно с помощью автоматического тонометра. |
| Выпадение волос | Используйте небольшое количество мягкого шампуня (для младенцев). Делайте выбор в пользу мягкой щётки. Избегайте слишком частого мытья волос. Избегайте источников тепла (фена, нагретых бигуди, горячего разглаживающего утюжка), красителей, мелирования и химической завивки. |
| Кровотечения | Избегайте принимать противовоспалительные средства (ибупрофен, аспирин...) Сообщите своему врачу: > о приёме антикоагулянтов или тромбоцитарных антиагрегантов: необходим тщательный мониторинг о случаях хирургического или стоматологического вмешательства. |
| Усталость / боль | Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха. |

КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ

| | |
|--------|--|
| Диарея | Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте побольше воды. |
|--------|--|



| | |
|----------------|--|
| Тошнота | Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи. |
| Удержание воды | Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием соли. |

