



## Що таке ТАРЦЕВА®

Назва препарату	Опис
Ерлотиніб	<p>Пігулка 25 мг: біла, кругла Пігулка 100 мг: біла, кругла Пігулка 150 мг: біла, кругла</p> 

## Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.




У Вашому випадку дозування таке: ..... мг/день, тобто 1 пігулка .....мг/день, один раз на день, щодня.

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не подрібнюючи, не розрізаючи, не розжовуючи та не розчиняючи пігулки.

У встановлений час, з проміжком часу між прийомом ліків та прийомом їжі (на Ваш вибір: за 1 годину до їжі чи через 2 години після їжі).

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

## Дозування – схема приймання

Один раз на добу, у встановлений час, поза їжею		< 1 год — 2 год >		< 1 год — 2 год >		< 1 год — 2 год >			
Без перерви									
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7	...	Д28

## Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в аптеках за місцем проживання.

Для його отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь. Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

## Що ще треба знати?

### Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу функції печінки та нирок та рівня калію), а також моніторинг клінічного стану.

### Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

### Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між ТАРЦЕВОЮ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), які Ви вживаєте.

*Приклад:* При прийманні ТАРЦЕВИ® слід уникати вживання грейпфруту та звіробію, а також тютюнопаління.

## Які є можливі побічні явища?

**Нижче перелічені лише найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.**

### ПОБІЧНІ ЯВИЩА



Програма ONCOLIEN Товариства онкологічної фармації Франції надається у розпорядження відповідно до умов міжнародної ліцензії 4.0 «із зазначенням авторства — із збереженням умов». Баується на роботі <https://oncolien.sfpo.com>. Дозволи, що виходять за рамки цієї ліцензії, можна отримати на сайті <https://www.sfpo.com>.

Найбільш поширені	<p><b>Проблеми зі шкірою:</b> почервоніння, сухість, акне (прищі), висипи, інфекція чи розшарування нігтів, тріщини</p> <p><b>Порушення травлення:</b> діарея, нудота, запалення у роті (виразки), біль у животі, втрата апетиту</p> <p><b>Респіраторні захворювання:</b> кашель, задишка</p> <p><b>Інші:</b> інфекція, кон'юнктивит, стомленість</p>
<b>ПРО ЩО СЛІД ПОВІДОМЛЯТИ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ?</b>	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	<p><b>Порушення травлення</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Суттєва та (або) швидка втрата ваги</li> <li>&gt; Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу</li> <li>&gt; Біль у роті або виразки, що перешкоджають нормальному прийому їжі</li> <li>&gt; Сильний біль у животі</li> <li>&gt; Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин</li> </ul> <p><b>Проблеми зі шкірою</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Поява значних пухирів або сильне відшарування шкіри</li> </ul> <p><b>Респіраторні захворювання</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Постійний посилюючий кашель чи утруднене дихання</li> </ul> <p><b>Проблеми з очима</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Біль в очах, сльозотеча або почервоніння, нечіткість зору або чутливість до світла</li> </ul> <p><b>Симптоми, що свідчать про інфекцію</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Температура &gt; 38,5 °C</li> <li>&gt; Кашель, біль у горлі, біль при сечовипусканні, діарея з підвищеною температурою</li> </ul>
<b>ЯК ЗАПОБІГТИ ПОБІЧНИМ ЯВИЩАМ?</b>	
Вага	При розладах травлення <b>регулярно перевіряйте свою вагу.</b>
Догляд за шкірою	<b>Робіть вибір на користь</b> м'якого мила та зволожувального засобу, підсушуйте шкіру промоканням. <b>Уникайте</b> використання будь-яких продуктів, що дратують шкіру. <b>Для захисту від сонця використовуйте</b> крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та <b>уникайте</b> впливу сонячних променів.
Догляд за нігтями	<b>Уникайте</b> травм нігтів на руках та ногах. <b>Уникайте</b> використання лаків, за винятком захисного лаку, спеціально рекомендованого медперсоналом. <b>Робіть вибір на користь</b> прямої форми нігтів і не підстригайте нігті надто коротко.
Гігієна порожнини рота	<b>Використовуйте</b> м'яку зубну щітку, <b>використовуйте</b> ополаскувачі для рота, що містять питну соду. <b>Уникайте</b> ополіскувачів для рота, що містять ментол або спирт.
Очі	<b>Уникайте</b> контактних лінз. <b>Уникайте</b> водити машину при слабкій освітленості.
Інфекція	<b>Уникайте</b> відвідувати місця підвищеного ризику (скупчення людей, контакт із хворими людьми, ...). Вам може бути <b>рекомендовано щеплення</b> від грипу та від пневмококової інфекції: воно Вас захистить
Стомленість	<b>Робіть вибір на користь</b> занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт... <b>Чергуйте</b> періоди активності та відпочинку.
<b>ЯК АДАПТУВАТИ СВОЮ ДІЄТУ?</b>	
Діарея	<b>Робіть вибір на користь</b> дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще <b>вживати</b> продукти, що містять крохмаль моркву, банани. <b>Уникайте</b> вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. <b>Пийте</b> більше води.
Нудота	<b>Робіть вибір на користь</b> дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. <b>Обмежте</b> споживання жирної, смаженої та гострої їжі.
Запалення у роті (виразки)	<b>Уникайте</b> вживання кислої, клейкої та дуже солоної їжі.
Втрата апетиту	<b>Робіть вибір на користь</b> більш калорійної дієти та «дієти задоволення».

