



При лікуванні флутамідом у поєднанні з агоністом генадотропного релізінгу гормону (ГнРГ)	<b>Порушення травлення:</b> діарея, нудота, блювота, підвищений апетит <b>Відхилення від норми печінкових проб</b> <b>Приливи, зниження лібідо</b>
Деякі пацієнти потребують особливої уваги	Пацієнти з діабетом (ризик гіперглікемії)
<b>ПРО ЩО СЛІД ПОВІДОМЛЯТИ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ?</b>	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	<b>Порушення травлення</b> > Суттєва та (або) швидка втрата ваги > Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу > Сильний біль у животі > Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин <b>Проблеми з лібідо</b> <b>Порушення функції печінки</b> > Жовтяниця <b>Ознаки ціанозу</b> > Синюваті нігті та (або) губи <b>Симптоми, що свідчать про порушення роботи серця</b> > Нез'ясовне збільшення ваги > набряк кінцівок
<b>ЯК ЗАПОБІГТИ ПОБІЧНИМ ЯВИЩАМ?</b>	
Вага	При розладах травлення або набряках <b>регулярно перевіряйте свою вагу.</b>
Стомленість	<b>Робіть вибір на користь</b> занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт... <b>Чергуйте</b> періоди активності та відпочинку.
Приливи	<b>Займайтеся</b> підібраними видами фізичного навантаження. <b>Уникайте</b> джерел тепла.
<b>ЯК АДАПТУВАТИ СВОЮ ДІЄТУ?</b>	
Діарея	<b>Робіть вибір на користь</b> дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще <b>вживати</b> продукти, що містять крохмаль мorkву, банани. <b>Уникайте</b> вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. <b>Пийте</b> більше води.
Нудота	<b>Робіть вибір на користь</b> дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. <b>Обмежте</b> споживання жирної, смаженої та гострої їжі.

