



Что такое ГИОТРИФ®

Название препарата	Описание
Афатиниб	Таблетка 20 мг: круглая, бело-желтоватая Таблетка 30 мг: круглая, тёмно-синяя Таблетка 40 мг: круглая, голубая Таблетка 50 мг: овальная, тёмно-синяя

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова:..... мг/день, т.е. таблетка(ок)/день, один раз в день, каждый день.


Глотать целиком, запивая стаканом воды. Таблетки не дробить, но если трудно проглотить целиком, их можно развести.

При необходимости развести в приблизительно 100 мл негазированной воды (не использовать никакую другую жидкость), периодически взбалтывая (15 мин). Раствор выпить незамедлительно. Прополоскать стакан, используя приблизительно 100 мл питьевой воды.

В установленное время, с промежутком времени между приёмом лекарства и приёмом пищи (за 1 час до еды или через 3 часа после еды).

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма



Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеках по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните это средство в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга функции почек и печени и уровня калия), а также мониторинг клинического состояния (артериальное давление, электрокардиограмма, скинтиграфия сердца).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между ГИОТРИФОМ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме ГИОТРИФА® следует избегать употребления зверобоя и йохимбина.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ	
Самые распространённые	Проблемы с кожей: сыпь, зуд, акне, сухость, воспаление ладоней, стоп ног и участков трения (ладонно-подошвенный синдром) Ногти: паронихия (инфекция ногтей), расслаивание ногтей Нарушения пищеварения: диарея, воспаления во рту (язвы), тошнота/рвота Прочие: носовые кровотечения



Некоторые пациенты требуют особого внимания	Пациенты с кардиологическим анамнезом
О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<p>Нарушения пищеварения</p> <ul style="list-style-type: none"> > Существенная и (или) быстрая потеря веса > Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки > Боль во рту или язвы, препятствующие нормальному приёму пищи > Сильная боль в животе <p>Прочее</p> <ul style="list-style-type: none"> Боль в глазах, слезотечение или покраснение, нечёткость зрения или чувствительность к свету > Постоянный усиливающийся кашель или затруднённое дыхание
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?	
Уход за кожей	<p>На кистях рук и стопах : Наносите крем или увлажняющее молочко, и (или) заживляющий крем на кисти рук и стопы (не втирая сильно). Не подвергайте кисти рук и стопы воздействию высоких температур (горячей воды). Избегайте действий, которые вызывают трение или повреждение кожи. Избегайте слишком тесной одежды, носков и обуви.</p> <p>Тело: Делайте выбор в пользу мягкого мыла и увлажняющего средства, осушайте кожу промокающим. Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу. Для защиты от солнца используйте крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра и избегайте воздействия солнечных лучей.</p>
Ногти	<p>Избегайте травм ногтей на руках и ногах. Избегайте использования лаков, за исключением защитного лака, специально рекомендованного Вам медперсоналом.</p> <p>Делайте выбор в пользу прямой формы ногтей и не подстригайте ногти слишком коротко.</p>
Глаза	Избегайте носить контактные линзы.
Вес	При расстройствах пищеварения регулярно проверяйте свой вес .
Гигиена полости рта	<p>Используйте мягкую зубную щетку, используйте ополаскиватели для рта, содержащие питьевую соду.</p> <p>Избегайте ополаскивателей для рта, содержащих ментол или спирт.</p>
КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?	
Диарея	<p>Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы.</p> <p>Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя.</p> <p>Пейте побольше воды.</p>
Потеря аппетита	Делайте выбор в пользу более калорийной диеты и «диеты удовольствия».
Тошнота	<p>Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд.</p> <p>Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.</p>
Воспаление во рту (язвы)	Избегайте употребления кислой, клейкой и очень солёной пищи.

