



Что такое ГЛИВЕК®

Название препарата	Описание
Иматиниб	<p>Таблетка 100 мг: круглая, оранжевая Таблетка 400 мг: овальная, оранжевая</p> <p>Существуют непатентованные препараты различной формы</p> 

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова:..... мг/день, т.е. таблеток 100 мг и таблеток 400 мг, принимать раз в день, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая таблетки.

При необходимости развести в приблизительно стакане негазированной воды или яблочного сока (не использовать никакую другую жидкость), периодически размешивая. Раствор выпить незамедлительно. Ополосните стакан водой и выпейте.

Принимать в установленное время во время еды, во избежание потенциальной боли в желудке.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

Один или два раза в день, в установленное время, во время еды									
Без перерыва									
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7	...	Д28

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеке по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните это средство в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей формулы крови, урикемии и функции печени), а также мониторинг клинического состояния (артериальное давление).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между ГЛИВЕКОМ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме ГЛИВЕКА® следует избегать употребления зверобоя и грейпфрута.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.



ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ	
Самые распространённые	<p>Нарушения пищеварения: тошнота, рвота, диарея, боли в желудке</p> <p>Отклонения в количественных показателях состава крови: низкое содержание тромбоцитов (тромбоцитопения) и (или) многоядерных нейтрофилов (нейтропения), низкий уровень гемоглобина (анемия)</p> <p>Общие проблемы: отёк конечностей и (или) лица, удержание воды</p> <p>Боли: судороги, боль в мышцах и (или) в суставах, головные боли</p> <p>Проблемы с кожей: сыпь на коже, краснота, зуд, сухость кожи, повышенная чувствительность к воздействию солнца</p> <p>Кровотечения, усталость</p>
Некоторые пациенты требуют особого внимания	<p>Пациенты – носители вируса гепатита Б</p> <p>Пациенты с гипотиреозом</p>
О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<p>Нарушения пищеварения</p> <ul style="list-style-type: none"> > Существенная и (или) быстрая потеря веса > Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки > Сильная боль в животе > Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов <p>Симптомы, свидетельствующие об инфекции</p> <ul style="list-style-type: none"> > Температура > 38,5 °C > Кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании, диарея с повышенной температурой <p>Симптомы, свидетельствующие о кровоизлиянии</p> <ul style="list-style-type: none"> > Кровь в стуле или в рвотных массах (в случае рвоты) Гематомы (синяки), носовые кровотечения <p>Респираторные заболевания</p> <ul style="list-style-type: none"> Постоянный усиливающийся кашель или трудности с дыханием <p>Боль, мешающая Вам заниматься своей обычной деятельностью</p> <ul style="list-style-type: none"> > Головные боли > Боль в суставах <p>Симптомы, свидетельствующие об удержании воды</p> <ul style="list-style-type: none"> > Быстрое и неожиданное увеличение веса
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?	
Уход за кожей	<p>Делайте выбор в пользу мягкого мыла и увлажняющего средства, осушайте кожу промоканием.</p> <p>Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу.</p> <p>Для защиты от солнца используйте крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра и избегайте воздействия солнечных лучей</p>
Вес	<p>При расстройствах пищеварения или удержании воды регулярно проверяйте свой вес.</p>
Удержание воды (отёчность рук и ног)	<p>Избегайте слишком тесной одежды, носков и обуви. Кладите ноги в возвышенное положение.</p>
Инфекция	<p>Избегайте посещать места повышенного риска (скопление людей, контакт с больными людьми,...).</p> <p>Вам может быть рекомендована прививка от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит.</p>
Боль в суставах	<p>Занимайтесь подобранными видами физической нагрузки.</p>
Кровотечения	<p>Избегайте принимать противовоспалительные средства (ибупрофен, аспирин...)</p> <p>Сообщите своему врачу:</p> <ul style="list-style-type: none"> > о приёме антикоагулянтов или тромбоцитарных антиагрегантов: необходим тщательный мониторинг о случаях хирургического или стоматологического вмешательства.
Усталость	<p>Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт...</p> <p>Чередуйте периоды активности и отдыха.</p>
КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?	
Диарея	<p>Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы.</p> <p>Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя.</p> <p>Пейте побольше воды.</p>
Тошнота	<p>Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд.</p> <p>Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.</p>
Удержание воды	<p>Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием соли.</p>

