



Что такое ТАЙВЕРБ®

Название препарата	Описание
Лапатиниб	Таблетка 250 мг: коричневая, овальная

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: мг/день, т.е., таблетка(ок) 250 мг 1 раз в день каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая, не разрезая, не разжёвывая и не растворяя таблетки.

В установленное время. С промежутком времени между приёмом лекарства и приёмом пищи (за 1 час до еды или через 1 час после еды).

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

Один раз в день, в установленное время, вне еды									
Без перерыва									
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7		Д28

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеках по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните это средство в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей состава крови, функции печени и уровня калия), а также мониторинг клинического состояния (артериальное давление, электрокардиограмма, сцинтиграфия сердца).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребёнку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между ТАЙВЕРБом® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме ТАЙВЕРБа® следует избегать употребления зверобоя и грейпфрута.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ



Самые распространённые	<p>Нарушения пищеварения: диарея, тошнота, рвота, потеря аппетита и веса.</p> <p>Проблемы с кожей: сухость, прыщи (акне), воспаление ладоней, подошв и участков трения (особенно в сочетании с капецитабином), изменения ногтей, чувствительность к солнечным лучам</p> <p>Боли: в суставах и конечностях, головные боли</p> <p>Отклонения в результатах лабораторных исследований: отклонение от нормы печёночных проб</p> <p>Нарушения работы сердца</p> <p>Прочие: кашель, усталость, приливы</p>
О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?	

Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<p>Нарушения пищеварения</p> <ul style="list-style-type: none"> > Существенная и (или) быстрая потеря веса > Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки > Сильная боль в животе > Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов <p>Симптомы, свидетельствующие о нарушении работы сердца</p> <p>Одышка, учащённое сердцебиение, боль или стеснение в груди</p> <p>Проблемы с кожей</p> <ul style="list-style-type: none"> > Появление значительных волдырей или сильное отслоение кожи > Усиление боли или воспаления кистей рук и стоп <p>Респираторные заболевания</p> <ul style="list-style-type: none"> > Постоянный усиливающийся кашель или затруднённое дыхание <p>Боль, мешающая Вам заниматься своей обычной деятельностью</p> <ul style="list-style-type: none"> > Головные боли > Боль в суставах
--	--

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?

Вес	При расстройствах пищеварения регулярно проверяйте свой вес.
Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.
Уход за кожей	На кистях рук и стопах: Наносите крем или увлажняющее молочко, и (или) заживляющий крем на кисти рук и стопы (не втирая сильно). Не подвергайте кисти рук и стопы воздействию высоких температур (горячей воды). Избегайте действий, которые вызывают трение или повреждение кожи. Избегайте слишком тесной одежды, носков и обуви. Тело: Делайте выбор в пользу мягкого мыла и увлажняющего средства, осушайте кожу промоканием. Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу. Для защиты от солнца используйте крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра. Избегайте воздействия солнечных лучей.
Уход за ногтями	Избегайте травм ногтей на руках и ногах. Избегайте использования лаков, за исключением защитного лака, специально рекомендованного Вам медперсоналом. Делайте выбор в пользу прямой формы ногтей и не подстригайте ногти слишком коротко.
Приливы	Занимайтесь подобранными видами физической нагрузки. Избегайте источников тепла.
Боль в суставах	Занимайтесь подобранными видами физической нагрузки.

КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?

Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте побольше воды.
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Приливы	Избегайте употребления острой пищи с алкоголем или кофеином. Пейте холодные напитки и в большом количестве.

